

# Canikur® Pro



Boehringer  
Ingelheim

Aliment complémentaire pour le soutien de la flore intestinale des chiens et chats. Seringue de 15 ml ou 30 ml.

## Destinés aux animaux

Aliment complémentaire pour le soutien de la flore intestinale naturelle des chiens et chats. Contient une souche de bactéries probiotiques naturellement présentes dans le tractus intestinal sain. Contient aussi du Bio-Mos®-C (prébiotique) qui soutient la croissance des bactéries utiles dans le tractus intestinal, et de la bentonite, un agent naturel adsorbant et thixotrope. Bio-Mos®-C est une marque commerciale d'Alltech, Inc.

## Constituants analytiques

Protéines brutes	6,0%
Cellulose brute	1,5%
Huiles et matières grasses brutes	41,1%
Cendres brutes	21,1%
Cendres insolubles	
dans l'acide chlorhydrique	13,0%
<i>Enterococcus faecium</i>	5 x 10 <sup>11</sup> UFC/ par kg

## Composition

Huile de soja, levure inactivée et composants, hydrolysat de protéine végétale (farine de lupin), glucose, chlorure de sodium, phosphate disodique, huile de tournesol

## Additifs

*Enterococcus faecium* (DSM 10663/ NCIMB 10415) (stabilisateur de la flore intestinale) : 2 x 10<sup>12</sup> UFC par kg, bentonite (1m558i; liant) : 17 %.

## Dosage et administration

Chats: 1-2 ml deux fois par jour  
Chiots, chiens petits (poids 10 kg et moins) :  
2 ml deux fois par jour  
Chiens de taille moyenne (11-25 kg) :  
4 ml deux fois par jour  
Chiens de grande taille (26-40 kg) :  
6 ml deux fois par jour  
Chiens XL (plus de 40 kg) :  
8 ml deux fois par jour  
Tournez l'anneau de la seringue jusqu'au dosage souhaité et poussez le piston pour faire sortir la pâte Canikur® Pro. Déposez-la sur la nourriture ou directement dans la gueule du chien ou chat. Tenez-vous à la dose recommandée.

Après utilisation, il est recommandé de replacer le bouchon sur la seringue afin d'éviter que la pâte sèche.

Utilisez aussi longtemps que nécessaire ou suivant les recommandations du vétérinaire (mais pas plus de 4 semaines) pour maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale pendant les périodes de stress, de traitement anti-biotique ou toute autre période pendant laquelle la flore intestinale peut être déréglée.

Les antibiotiques du groupe des macrolides, administrés par voie orale, sont capturés par la bentonite et l'utilisation simultanée doit être évitée.

## Conservation

Conservé au sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de la chaleur.

## Distributeur

Boehringer Ingelheim  
Animal Health Belgium SA,  
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23,  
1050 Bruxelles  
Vetmedica.BE@boehringer-ingelheim.com  
HN105314

## Fabricant pour

Boehringer Ingelheim  
Animal Health:  
αGB2800019

## N° de lot

Voir côté de la boîte.

## A utiliser de préférence avant

Voir "EXP MM/AA" sur le côté de la boîte.

# Canikur® Pro

Aanvullend diervoeder voor honden en katten ter ondersteuning van de natuurlijke darmflora.  
Doseerspuit van 15 ml of 30 ml

## Voor gebruik bij dieren

Aanvullend diervoeder ter ondersteuning van de natuurlijke darmflora bij honden en katten. Bevat een stam van probiotische bacteriën die van nature aanwezig zijn in het gezonde darmkanaal. Bevat ook Bio-Mos®-C (pre-biotisch), dat de groei van nuttige bacteriën in het darmkanaal ondersteunt, en bentoniet, een natuurlijke bindende stof. Bio-Mos®-C is een handelsmerk van Alltech, Inc.

## Analytische bestanddelen

Ruw eiwit	6,0%
Ruwe celstof	1,5%
Ruwe olie en vetten	41,1%
Ruwe as	21,1%
As onoplosbaar in zoutzuur	13,0%
<i>Enterococcus faecium</i> 5 x 10 <sup>11</sup> KVE per kg	

## Samenstelling

Sojaolie, geïnactiveerde gist en bestanddelen, lupinemeel, glucose, natriumchloride, dinatriumfosfaat, zonnebloemolie.

## Toevoegingsmiddelen:

*Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) (darmflora stabilisator): 2 x 10<sup>12</sup> KVE per kg, bentoniet (1m558i; bindmiddel): 17 %.

**Dosering en toediening**

Katten:

1-2 ml tweemaal daags

Puppies en kleine honden (10 kg en minder): 2 ml tweemaal daags

Middelgrote honden (11-25 kg):

4 ml tweemaal daags

Grote honden (26-40 kg):

6 ml tweemaal daags

Zeer grote honden (meer dan 40 kg):

8 ml tweemaal daags

Draai de ring op de doseerspuit tot de gewenste dosering en spuit de Canikur® Pro pasta in de voedingsbak of direct in de bek van de hond of kat. Geef niet meer dan de aanbevolen dosering.

Het wordt aangeraden om de dop na gebruik op het uiteinde te plaatsen om uitdrogen te voorkomen.

Gebruik Canikur® Pro om de natuurlijke balans van de darmflora te ondersteunen tijdens perioden van stress, een antibioticumbehandeling of andere momenten waarbij de darmflora ontregeld kan worden.

Gebruik Canikur® Pro zolang het nodig is of volgens de aanwijzingen van de dierenarts, maar niet langer dan vier weken.

Het bestanddeel bentoniet kan macrolide antibiotica binden, zodat een gelijktijdige orale toepassing met macroliden vermeden moet worden.

**Bewaring**

Droog bewaren, beschermd tegen direct zonlicht en hoge temperaturen.

**Distributeur**

Verdeler België:

Boehringer Ingelheim

Animal Health Belgium SA,

Arnaud Fraiteurlaan 15-23,

1050 Brussel

Vetmedica.BE@boehringer-ingelheim.com

HN105314

Verdeler Nederland:

Boehringer Ingelheim

Animal Health Netherlands B.V.

Comeniusstraat 6

1817 MS ALKMAAR

Nederland

Reg. no. 500197

**Fabrikant voor**

Boehringer Ingelheim

Animal Health:

αGB2800019

**Lot nr.**

Zie zijkant doos.

**Tenminste houdbaar tot**

Zie "EXP" op zijkant doos.

# Canikur® Pro

Ergänzungsfuttermittel zur Unterstützung der natürlichen Darmflora bei Hunden und Katzen. 15 ml oder 30 ml

**Für die Anwendung bei Tieren**

Ergänzungsfuttermittel zur Unterstützung einer gesunden Darmflora bei Hunden und Katzen. Enthält Probiotica, die natürlich in einer gesunden Darmflora vorkommen. Enthält Prebiotika Bio-Mos®-C, die das

Wachstum gesundheitsförderlicher Bakterien im Darm unterstützen und Bentonit, ein natürliches Bindemittel. Bio-Mos®-C ist eine Marke von Alltech, Inc.

**Analytische Inhaltstoffe:**

Rohprotein	6,0%
Rohfaser	1,5%
Rohölle und -fette	41,1%
Rohasche	21,1%
HCl unlösliche Asche	13,0%
<i>Enterococcus faecium</i> 5 x 10 <sup>11</sup> CFU per kg	

**Zusammensetzung**

Sojaöl, inaktivierte Hefe und Bestandteile, Lupinenmehl, Glukose, Natriumchlorid, Dinatriumphosphat, Sonnenblumenöl

**Zusatzstoffe**

*Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415 (Darmflora-Stabilisator): 2 x 10<sup>12</sup> CFU per kg, Bentonit (1m558i; Binder): 17 %.

**Dosering und Anwendung**

Katze:

1-2 ml zweimal täglich

Welpen/Hunde ≤ 10 kg:

2 ml zweimal täglich

Hunde ≥ 11 und ≤ 25 kg:

4 ml zweimal täglich

Hunde ≥ 26 und ≤ 40 kg:

6 ml zweimal täglich

Hunde &gt; 40 kg:

8 ml zweimal täglich

Drehen Sie den Ring an der Spritze bis zur gewünschten Dosierung und drücken Sie den Kolben, um die Canikur® Pro Paste herauszudrücken. Geben Sie die Paste auf die Nahrung oder direkt in das Maul des Hundes oder der Katze. Geben Sie nicht mehr als die empfohlene Dosis. Nach der Verwendung die Spritze wieder mit der Kappe verschließen, um das Austrocknen der Paste zu vermeiden.

Verwenden Sie Canikur® Pro so lange, wie es als notwendig erachtet wird oder vom Tierarzt empfohlen wurde, jedoch nicht länger als vier Wochen, zur Unterstützung der natürlichen Darmflora während Stressphasen, begleitend zu einer Antibiotika Behandlung oder bei anderen Ereignissen, die die natürliche Darmflora stören könnten.

Bentonit kann Makrolidantibiotika binden. Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden und Canikur® Pro ist zu vermeiden.

**Aufbewahrung**

Lagerung an einem trockenen Platz, vor Sonnenlicht und hohen Temperaturen geschützt.

**Vertrieb**

Boehringer Ingelheim

Animal Health Belgium SA,

Avenue Arnaud Fraiteurlaan 15-23,

1050 Brüssel

Vetmedica.BE@boehringer-ingelheim.com

HN105314

**Hersteller für**

Boehringer Ingelheim

Animal Health:

αGB2800019

**Lot nr.**

Siehe Packungsseite.

**Mindesthaltbarkeit**

Mindestens haltbar bis: siehe "EXP MM/JJ"